Willkommen beim 2. Tutorium

Statistik für JoKo bei Prof. Knieper

Wdh. der Vorlesung

Messung:

Voraussetzungen:

- Merkmalsträger
- Merkmale
- Messinstrument

Gütekriterien:

- Objektivität
- Reliabilität
- Validität

Wdh. der Vorlesung

Skalenniveaus: jedes Skalenniveau hat unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten

Kardinalskala/metrisch

Nominalskala	Ordinalskala	Intervallskala	Verhältnisskala
<ul style="list-style-type: none">– unterschiedliche Ausprägungen– keine Rangfolge – z.B. Farbe, Beruf, Geschlecht	<ul style="list-style-type: none">– Rangordnung möglich– Abstände sind nicht gleich – z.B. Schulnoten, Gütenoten	<ul style="list-style-type: none">– Abstände gleich– kein natürlicher Nullpunkt – z.B. Temperatur	<ul style="list-style-type: none">– Abstände gleich– natürlicher Nullpunkt – z.B. Körpergröße, Gewicht, Preise

Wdh. der Vorlesung

Skalenniveaus: jedes Skalenniveau hat seine eigenen Bedingungen

Kardinalskala/metrisch

Nominalskala	Ordinalskala	Intervallskala	Verhältnisskala
<ul style="list-style-type: none">– Reflexivität ($a=a$)– Symmetrie ($a=b$ und $b=a$)– Transitivität ($a=b$, $b=c$, $a=c$)– Homomorphie ($a \in A$, $a \notin B$)	<ul style="list-style-type: none">– Trichotomie ($a=b$, $a < b$, $a > b$)– Transitivität ($a < b$, $b < c$, $a < c$)	<ul style="list-style-type: none">– positive lineare Funktion ($y=ax+b$)	<ul style="list-style-type: none">– multiplikative Transformationen ($y=ax$ mit $a \neq 0$)

Wdh. der Vorlesung

Wahrscheinlichkeitsbegriffe:

Alltäglicher
Wahrscheinlichkeitsbegriff:

- Ein Ereignis hat eine bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeit
- Das Eintreten des Ereignisses ist nicht gewiss, folgt jedoch bestimmten Gesetzmäßigkeiten

Wdh. der Vorlesung

Wahrscheinlichkeitsbegriff nach Laplace:

- Zahl der günstigen Fälle geteilt durch die Zahl der (gleich) möglichen Fälle
- Voraussetzung: Zahl der möglichen/günstigen Fälle muss bekannt sein und die Wahrscheinlichkeiten müssen gleich sein

$$\frac{\text{Anzahl der günstigen Fälle}}{\text{Anzahl der (gleich) möglichen Fälle}}$$

Wdh. der Vorlesung

Frequentistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff:

- Grenzwert (Limes) der relativen Häufigkeiten des Auftretens eines Ereignisses in einer unendlichen Versuchsreihe
- Problem: viele Zufallsexperimente lassen sich in der Praxis nicht beliebig wiederholen

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$$

Wdh. der Vorlesung

Subjektivistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff:

- Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses bemisst sich nach dem Grad der Überzeugung
- Der Versuch etwas zu quantifizieren auf Basis der derzeitigen Kenntnisstandes

Übungs aufgaben

Aufgabe 1

Gegeben sind fünf Aussagen über Wahrscheinlichkeiten. Ordne diese den bekannten Wahrscheinlichkeitsbegriffen zu.

- „Die Wahrscheinlichkeit, sich beim Einkaufen mit dem Coronavirus zu infizieren, liegt bei $\frac{1}{20}$.“
Lösung: frequentistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff
- „Freiburg hat die letzten Wochen echt gut gespielt, ich wette fünf Euro, dass sie auch gegen Leipzig gewinnen“
Lösung: subjektivistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff
- „Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Kartenspiel mit 32 Karten einen König zu ziehen, beträgt $\frac{1}{8}$.“
Lösung: Laplace'scher Wahrscheinlichkeitsbegriff
- „Der Club ist so voll, safe stecken wir uns heute mit Corona an“
Lösung: Alltäglicher Wahrscheinlichkeitsbegriff

Aufgabe 2

Welches Skalenniveau haben die folgenden Merkmale? (nom, ord, metr.)

– Wassertiefe eines Schwimmbeckens	metrisch
– Telefonnummern von Versandkunden	nominal
– Geschmacksrichtungen von Speiseeis	nominal
– Schulnoten auf einer Skala von 1 bis 6	ordinal
– Abstand zwischen zwei Gebäuden in cm	metrisch
– Preis eines Neuwagens in Euro und Cent	metrisch
– Haarfarbe von Kundinnen im Friseursalon	nominal
– Temperatur (Kelvin) eines glimmenden Holzscheits	metrisch
– Produktwertung auf einer Skala von 1 bis 5	ordinal
– Studiennoten auf einer Skala von 1,0 bis 5,0	ordinal

Aufgabe 1.1 der AS

Es liegt eine faire Münze vor. Betrachtet werden die beiden Zufallsexperimente „Doppelter Münzwurf“ und „Dreifacher Münzwurf“.

- a) Geben Sie für beide Zufallsexperimente den jeweiligen Ergebnisraum W an.
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei zweimaligem Werfen einer Münze
 - b1) zweimal Kopf
 - b2) einmal Kopf und einmal Zahl
 - b3) mindestens einmal Kopf auftritt?
- c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei drei Münzwürfen höchstens zweimal hintereinander dasselbe Ergebnis auftritt?

Aufgabe 1.1 der AS

a)

- Zufallsexperiment „Doppelter Münzwurf“
 $\Omega_{2W} = \{(K,K), (K,Z), (Z,K), (Z,Z)\}$
- Zufallsexperiment „Dreifacher Münzwurf“
 $\Omega_{3W} = \{(K,K,K), (K,K,Z), (K,Z,K), (Z,K,K), (K,Z,Z), (Z,K,Z), (Z,K,K), (Z,Z,Z)\}$

b)

- P(„zweimal Kopf“) = $P((K,K)) = \frac{1}{4} = 0,25$
- P(„einmal Kopf und einmal Zahl“) = $P((K,Z), (Z,K)) = \frac{2}{4} = 0,5$
- P(„mindestens einmal Kopf“) = $P((K,K), (K,Z), (Z,K)) = \frac{3}{4} = 0,75$

c)

- P(„höchstens zweimal hintereinander das gleiche Ergebnis“) = $1 - P(\text{„dreimal hintereinander das gleiche Ergebnis“}) = 1 - P((K,K,K), (Z,Z,Z)) = 1 - \frac{2}{8} = \frac{6}{8} = 0,75$

it's time
for a quiz!